vertissements agricoles



(R)

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F. Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 00 28 D

DIJON 35 00 28 0 EDITION GRANDES CULTURES

80.22.19.38

COLZA

Bulletin nº 16 - 22 Juin 1988

Alternaria: Ne plus intervenir

POIS

Tordeuse: Intervenir si les captures sont de l'ordre de 200

Maladies: Parcelles semées début avril: 2ème application fongicide

à raisonner

POIS

MALADIES

- Dans les parcelles semées début avril, le renouvellement de la protection est à réaliser dans un délai de 15-20 jours après la première application ; c'est à dire dans le courant de cette semaine pour les nombreuses applications faites début juin.
- Apprécier de l'opportunité de cette 2ème application selon l'importance des maladies présentes (le Botrytis a regressé depuis une semaine - présence irrégulière d'anthracnose) et selon le potentiel de la parcelle.

RAVAGEURS

Pucerons: Les niveaux de population ont tendance à diminuer.

Les traitements spécifiques ne sont pas justifiés.

Tordeuses : . Le second pic de vol noté depuis le 9/6 se poursuit encore actuellement.

La situation des piégeages selon le réseau est la suivante :

Yonne: Champlost - Villeroy: 200 - 250 captures

Senan - Laroche: 270 - 300 captures

Sens - Linan - Voisines: 70 - 100 captures

Côte d'Or: Epoisses: 600 - 700 captures

Chevigny Fenay - Binges - Bretigny - Champdôtre : 300 - 400 captures

Saulon - Quincey: 60 - 100 captures

Nièvre : Saint Martin sur Nohain : 230 captures

Varennes les Narzy: 60 captures

Les préconisations du bulletin précédent sont reconduites : Dans les secteurs ou les piégeages dépassent 200 captures cumulées, des interventions insecticides sont à réaliser dès réception et jusqu'au 25 - 28 Juin.

MAIS

Végétation très active depuis le relèvement des températures.

Stades : très variables suivant les dates de semis, atteignant 10 feuilles (80-90 cm) en situation précoce. 2.75

imprimeria de la Station BOURGOGNE : FRANCHE-COMTÉ : Directeur Gérant : J. SONDEY IN º du certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Pressa : 1700 AD 👪

nce Repensal de la Protection des Vésitaux 1986. Toute reproduction mans partielle est soumes à notre autoris

--- PYRALE

Le vol s'annonce particulièrement précoce en 1988. Les premiers papillons ont été observés en pièges sexuels dès le début de la semaine dernière dans l'Yonne, en fin de semaine en Haute-Saône et dans le Jura et dans les derniers jours en sud Côte d'Or et Saône et Loire.

Les dates d'intervention seront précisées lors d'un prochain bulletin en fonction des pontes observées. Elles pourraient, en secteurs précoces, notamment dans l'Yonne, débuter dans les tous premiers jours de juillet.

--- PUCERONS

Quelques individus de <u>Metopolophium dirhodum</u> et de <u>Sitobion avenae</u> sont parfois visibles sur les parcelles.

Les niveaux de population sont toujours très bas et ne justifient actuellement aucune intervention.

CULTURES LEGUMIERES

- MILDIOU

La maladie est présente dans les cultures et les risques de contaminations par le mildiou sont importants. Il est indispensable de ne pas laisser les parcelles d'oignons et de pommes de terre sans protection fongicide. Utiliser un produit à action interne.

POUR LES AVERTISSEMENTS AGRICOLES
PAR TELEMATIQUE APPELEZ

36.17 Code AVERT